

Du sang dans le lait

Avant de sauter aux conclusions d'une catastrophe, explorons les possibilités!



Possibles causes	Ce que ça nous dit
<ul style="list-style-type: none">• Blessure qui saigne• Blessure au sein• « Rusty Pipe Syndrome »• Mastite• Papillome• Cancer du sein	<ul style="list-style-type: none">• <u>Blessure qui saigne</u> : Examen du bébé, de la tétée d'un bout à l'autre, corriger la position, voir une IBCLC, ostéopathe. Quelque chose dans la mécanique de la tétée cloche.• <u>Blessure au sein</u> : Toutes les choses précédentes, si ce n'est pas le tire-lait, une maladie de peau, un trauma comme un coup, un accident de voiture• « <u>Rusty Pipe Syndrome</u> » Plus commun chez les nouvelles mamans, le RPS indique la présence de vieux sang dans les canaux qui se serait formé lors du changement des seins durant la grossesse. Le lait devient couleur rouille. C'est une condition temporaire qui dure quelques jours, lors du stade colostrale.• <u>Mastite</u> : La mastite est une infection généralement bactérienne du tissu mammaire. L'inflammation peut amener la présence de sang dans les canaux. La mastite doit être surveillée et si les symptômes grippaux durent plus de 24h sans amélioration, la maman doit consulter un médecin.• <u>Papillome</u> : On ne touche pas à ce sujet, mais on sait que ça existe.• <u>Cancer du sein</u> : On ne touche pas à ce sujet, mais on sait que ça existe.
<p style="text-align: center;">Conclusion</p> <p>Le sang dans le lait n'est ni un danger pour la mère, ni un danger pour le bébé. Il se peut que le bébé soit incommodé, soit par des régurgitations plus fréquentes, soit par des maux de ventre. Il est aussi très possible qu'il ait du sang dans ses selles (dépôt noirâtre). Il est conseillé de poursuivre l'allaitement.</p> <p>Si les saignements dans le lait persistent plus de quelques jours, il serait bon que cette maman voit un médecin ou une IBCLC si c'est un cas de blessures au mamelon.</p>	
<p style="text-align: center;">Comme marraine, je peux :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rassurer la mère sur les causes possibles et l'amener à explorer ces pistes• Référer à son médecin si elle vit plus d'inquiétude• Prendre des nouvelles et assurer un suivi• Empowerment de la maman	